平成15年産稲作こよみ

稲の一生

ヒノヒカリ

良食味米つくり3大目標
- ◎玄米水分15%
- ◎たんぱく質含量6.5%以下
- ◎整粒歩合80%以上



	5月			6月			7月			8月			9月			10月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
水管理					深水		浅水		中干し	間断灌水			やや深水	間断灌水				
	苗代期			活着期	有効分けつ期		無効分けつ期			穂の発育期間			乳熟期	登熟期				
主な作業	播種	種子の予措		田植	除草剤散布		中干し			穂肥			落水			適期刈取		

病害虫防除

種子消毒
- シンガレセンチュウ
- いもち病
- ばか苗病

混用
- バイジット乳剤 一、〇〇〇倍
- ヘルシード乳剤 二〇〇倍

（二十四時間浸漬）

［一般型］
- ツマグロヨコバイ
- ウンカ
- コブノメイガ
- いもち病

ビームアドマイヤースピノ粒剤 50g／箱

ビームバシボン5粉DL 4

［省力化型］
- ウンカ
- コブノメイガ
- 紋枯病
- いもち病

デラウスプリンスリンバー粒剤 50g／箱

ビームトレボン5粉DL 4

- ウンカ
- いもち病

MRジョーカー粉DL 4

- カメムシ
- ウンカ

MRジョーカー粉DL 4

初中期一発除草剤の使用方法について

ウィードレス 1キロ粒剤
- 1kg（1袋）／10アール
- 湛水状態で均一散布

ラクダー Lフロアブル
- ボトル1本／10アール（ボトルを振るだけ）
- 水深3～5cmの湛水状態で止水して散布
- 3～4日湛水状態を保ち、落水、かけ流しはしない

クサトリエース Lジャンボ
- パック10個／10アール（あぜから投げ込むだけ）
- 水深5～6cmの湛水状態で止水して散布
- 3～4日湛水状態を保ち、落水、かけ流しはしない

※注意事項
強風による吹き寄せや藻類等による薬剤の拡散阻害に十分注意して下さい。

除草剤の使い方

代かき　田植
－2日　0日　＋3日　＋5日　＋8日　＋10日　＋15日　＋25日　＋30日　＋35日

- ウィードレス粒剤（1　）
- ラクダー Lフロアブル
- クサトリエース Lジャンボ
- 2-4-Dアミン塩
- 粒状水中2-4-D
- グラスジン D水和剤
- グラスジン D粒

土づくり資材

（10a当り）

資材名	施用量	稲に対する効果
粒状エンリッチ40号	120	稲体が丈夫になり、倒伏に強く、千粒重が高まり、品質が向上します。
又は		
けい酸加里特号	40	根の活力を高め、茎葉が硬くなり、倒伏に強くなります。
Jフミン	40	堆肥の代替資材。根の活力を高めます。

施肥基準

（10a当り）

	肥料名	基肥	穂肥	成分量 N	成分量 P	成分量 K	備考
Ⅰ例	高度化成 284号	40		4.8	7.2	5.6	
	マップ 484号		20	2.8	1.6	2.8	
	計			7.6	8.8	8.4	
Ⅱ例	ひとふり	50		7.0	7.0	7.0	一発肥料
	計			7.0	7.0	7.0	

うまい、売れる米づくり8ポイント

1 土づくり
◎堆肥、ワラ、粒状エンリッチ40号、Jフミンの施用と深耕

2 健苗作り
◎は種量1箱漬籾140gのうす播でズングリ苗

3 強くて良い苗を少なく植える
◎1株3～4本植えで坪60株、稈、穂も大きく

4 出穂後の追肥はしない
◎玄米タンパク含量が多く、食味値低下

5 倒れない稲を作る
◎中干し、間断灌水、適期適量の肥料

6 落水はなるべくおそく
◎玄米の充実が良く、ツヤがある。出穂後35日

7 適期刈取
◎一穂の中で青籾が15%位残っている時

8 玄米水分15%を目標
◎過乾燥は食味低下、胴割米の発生

裏作休耕田はレンゲ栽培で土づくり

土づくりでうまい米づくりをしよう

H.15.1.1,200

よかよか　うまか　かみましき。

JAかみましき
上益城改良普及センター
町役場
熊本県産米品質向上運動本部